




New Day in Medicine
Новый День в Медицине

NDM



TIBBIYOTDA YANGI KUN

Ilmiy referativ, marifiy-ma'naviy jurnal



AVICENNA-MED.UZ



ISSN 2181-712X.
EiSSN 2181-2187

4 (66) 2024

**Сопредседатели редакционной
коллекции:**

**Ш. Ж. ТЕШАЕВ,
А. Ш. РЕВИШВИЛИ**

Ред. коллегия:

М.И. АБДУЛЛАЕВ
А.А. АБДУМАЖИДОВ
Р.Б. АБДУЛЛАЕВ
Л.М. АБДУЛЛАЕВА
А.Ш. АБДУМАЖИДОВ
М.А. АБДУЛЛАЕВА
Х.А. АБДУМАДЖИДОВ
М.М. АКБАРОВ
Х.А. АКИЛОВ
М.М. АЛИЕВ
С.Ж. АМИНОВ
Ш.Э. АМОНОВ
Ш.М. АХМЕДОВ
Ю.М. АХМЕДОВ
С.М. АХМЕДОВА
Т.А. АСКАРОВ
М.А. АРТИКОВА
Ж.Б. БЕКНАЗАРОВ (главный редактор)
Е.А. БЕРДИЕВ
Б.Т. БУЗРУКОВ
Р.К. ДАДАБАЕВА
М.Н. ДАМИНОВА
К.А. ДЕХКОНОВ
Э.С. ДЖУМАБАЕВ
А.А. ДЖАЛИЛОВ
Н.Н. ЗОЛотова
А.Ш. ИНОЯТОВ
С. ИНДАМИНОВ
А.И. ИСКАНДАРОВ
А.С. ИЛЬЯСОВ
Э.Э. КОБИЛОВ
А.М. МАННАНОВ
Д.М. МУСАЕВА
Т.С. МУСАЕВ
Ф.Г. НАЗИРОВ
Н.А. НУРАЛИЕВА
Ф.С. ОРИПОВ
Б.Т. РАХИМОВ
Х.А. РАСУЛОВ
Ш.И. РУЗИЕВ
С.А. РУЗИБОЕВ
С.А.ГАФФОРОВ
С.Т. ШАТМАНОВ (Кыргызстан)
Ж.Б. САТТАРОВ
Б.Б. САФОЕВ (отв. редактор)
И.А. САТИВАЛДИЕВА
Д.И. ТУКСАНОВА
М.М. ТАДЖИЕВ
А.Ж. ХАМРАЕВ
Д.А. ХАСАНОВА
А.М. ШАМСИЕВ
А.К. ШАДМАНОВ
Н.Ж. ЭРМАТОВ
Б.Б. ЕРГАШЕВ
Н.Ш. ЕРГАШЕВ
И.Р. ЮЛДАШЕВ
Д.Х. ЮЛДАШЕВА
А.С. ЮСУПОВ
Ш.Ш. ЯРИКУЛОВ
М.Ш. ХАКИМОВ
Д.О. ИВАНОВ (Россия)
К.А. ЕГЕЗАРЯН (Россия)
DONG JINCHENG (Китай)
КУЗАКОВ В.Е. (Россия)
Я. МЕЙЕРНИК (Словакия)
В.А. МИТИШ (Россия)
В.И. ПРИМАКОВ (Беларусь)
О.В. ПЕШИКОВ (Россия)
А.А. ПОТАПОВ (Россия)
А.А. ТЕПЛОВ (Россия)
Т.Ш. ШАРМАНОВ (Казахстан)
А.А. ЩЕГОЛОВ (Россия)
Prof. Dr. KURBANHAN MUSLUMOV (Azerbaijan)
Prof. Dr. DENIZ UYAK (Germany)

**ТИББИЁТДА ЯНГИ КУН
НОВЫЙ ДЕНЬ В МЕДИЦИНЕ
NEW DAY IN MEDICINE**

*Илмий-рефератив, маънавий-маърифий журнал
Научно-реферативный,
духовно-просветительский журнал*

УЧРЕДИТЕЛИ:

**БУХАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
ООО «ТИББИЁТДА ЯНГИ КУН»**

Национальный медицинский
исследовательский центр хирургии имени
А.В. Вишневского является генеральным
научно-практическим
консультантом редакции

Журнал был включен в список журнальных
изданий, рецензируемых Высшей
Аттестационной Комиссией
Республики Узбекистан
(Протокол № 201/03 от 30.12.2013 г.)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

М.М. АБДУРАХМАНОВ (Бухара)
Г.Ж. ЖАРЫЛКАСЫНОВА (Бухара)
А.Ш. ИНОЯТОВ (Ташкент)
Г.А. ИХТИЁРОВА (Бухара)
Ш.И. КАРИМОВ (Ташкент)
У.К. КАЮМОВ (Тошкент)
Ш.И. НАВРУЗОВА (Бухара)
А.А. НОСИРОВ (Ташкент)
А.Р. ОБЛОКУЛОВ (Бухара)
Б.Т. ОДИЛОВА (Ташкент)
Ш.Т. УРАКОВ (Бухара)

4 (66)

2024

апрель

www.bsmi.uz

https://newdaymedicine.com E:

ndmuz@mail.ru

Тел: +99890 8061882

Received: 20.03.2024, Accepted: 10.04.2024, Published: 15.04.2024

УДК 616.223-007.64

РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ НА ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ БРОНХОЭКТАЗАМИ

Алиев Махмуд Муслимович, Тилавов Ўктам Хамраевич, Султанов Хашиим Хидирович

Ташкентский педиатрический медицинский институт, 100140, Узбекистан Ташкент, ул. Богишамол, 223, тел: 8 71 260 36 58 E.mail: interdep@tashpmi.uz
Детский Национальный медицинский центр, Узбекистан.

✓ Резюме

Проведен анализ результатов комплексного обследования и лечения 64 детей в возрасте от 2 мес. до 18 лет с врожденной бронхоэктазией. На основе совершенствования оперативной техники резекции пораженных бронхов и интраоперационной пломбировки его отмечена достаточно высокая эффективность лечения больных данной категории.

Ключевые слова: врожденная бронхоэктазия, резекция легкого, пломбировка бронхов, у детей.

ТУГМА БРОНХОЭКТАЗИЯ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАР ЎПКАЛАРИДА АЪЗО САҚЛОВЧИ ОПРАЦИЯЛАР НАТИЖАЛАРИ

Алиев Махмуд Муслимович, Тилавов Ўктам Хамраевич, Султанов Хашиим Хидирович

Тошкент педиатрия тиббиёт институти, Ўзбекистон 100140, Тошкент, Богишамол кўчаси 223, тел: 8 71 260 36 58 E.mail: interdep@tashpmi.uz
Болалар Миллий тиббиёт маркази, Ўзбекистон.

✓ Резюме

Тугма бронхоэктазия таъхиси билан 2 ойликдан 18 ёшгача бўлган 64 нафар болаларда ўтказилган комплекс текширув ва даволаш натижалари таҳлил қилинган. Зарарланган бронхларнинг резекцияси ва унинг интраоперацион пломбировкасини ҳисобига ушбу касаллик билан озриган беморларни даволашда юқори самарадорлик қайд этилди.

Калитли сўзлар: тугма бронхоэктазия, ўпка резекцияси, бронхлар пломбировкаси, болалар.

RESULTS OF THE ORGAN-CONSERVING OPERATIONS ON LUNGS IN CHILDREN WITH CONGENITAL BRONCHIECTASIS

Aliyev Mahmud Muslimovich, Tilavov Uktam Hamrayevich, Sultanov Khashim Xidirovich

Tashkent Pediatric Medical Institute, Uzbekistan 100140, Tashkent, 223 Bogishamol St, tel: 8 71 260 36 58 E.mail: interdep@tashpmi.uz
National children's medical center, Uzbekistan

✓ Resume

The results of a comprehensive examination and treatment in 64 children aged from 2 month to 18 years who had congenital bronchiectasis were analyzed. Improvement of surgical techniques of bronchial resection and filling yielded good results in patients of this category.

Key words: congenital bronchiectasis, lung resection, bronchial filling, children.

Актуальность

Патогенетически обоснованная терапия врожденной бронхоэктазии является важной проблемой торакальной хирургии детского возраста. Заболевание характеризуется формированием патологически необратимого процесса с образованием бронхоэктазов

преимущественно в мелких и средних бронхах, с развитием в них периодически обостряющегося хронического гнойного воспаления, которые могут быть устранены только хирургическим путем. Однако педиатры неохотно направляют детей в хирургические клиники, придавая главное значение консервативным методам лечения. Изучение отдаленных результатов показывает значительную эффективность хирургического метода лечения. В то же время ряд принципиальных вопросов хирургического лечения бронхоэктазии остаются не до конца решенными. Одним из важных положений является вопрос о возможности разгрузочного шунтирования в малом круге кровообращения через сосуды отключенных от бронхиальной системы участков легкого. С одной стороны, имеются сомнения в сохранении проходимости сосудов в длительные сроки после операции из-за нарастающего пневмофиброзирования в зонах пломбированного легкого, с другой стороны, существует опасность, избыточного шунтирования неоксигенированной крови (артериовенозное шунтирование) и развития гипоксии у пациентов, особенно при физической нагрузке.

Цель исследования: Улучшение и оптимизация лечебной тактики при бронхоэктатической болезни у детей.

Материал и методы

В клинике детской хирургии ТашПМИ и ДНМЦ при хирургическом лечении бронхоэктазий наряду с классической резекцией пораженных отделов легкого (32 больных) с 1990 года применяются операции отключения пораженных бронхов: экстирпация бронхов и экономные резекции участков поражения (15 больных). С 2003 года начали применять резекцию и пломбировку эктазированных бронхов (17 больных). Экстирпацию пораженных бронхов и их пломбировку выполняли, главным образом, при поражении нижних долей и изолированно базальных сегментов легкого (Табл. 1).

Таблица 1. Варианты операций на легких и количество оперированных больных

Объем отключенной паренхимы легкого					
Варианты Операции	Доля		Доля + сегменты	Сегменты	Всего
	1	2			
Экстирпация бронхов	9	-	2	4	15
Лоб-билобэктомии	23	9	-	-	32
Резекция и пломбировка бронхов	12	-	5	-	17
Итого	44	9	7	4	64

Проведено комплексное обследование 12 пациентов в сроки от 2 до 15 лет после их оперативного лечения. Наряду с общеклиническим обследованием выполнялось исследование внешнего дыхания, газов крови, бронхоскопия, бронхография, измерение давления крови в системе малого круга кровообращения, компьютерная спирометрия.

Результат и обсуждение

Изучение ближайших результатов оперативного лечения показали, что в зоне резекции и пломбировки клинически достигается полный санирующий эффект. Если проводится резекция или экстирпация бронхов неателектазированного участка легкого, то воздушность их сохраняется в ранние и отдаленные сроки наблюдения (от 3 мес. до 1 года). Установлено, что в резецированных и эктомированных участках легкого выявляли сетчатый пневмосклероз, который больше был характерен для ателектатических форм поражения. В то время как, в резецированных и пломбированных зонах, значительного прогрессирования склероза не


наблюдали. Максимальный срок сохранения пневматизации plombированных сегментов легкого и санирующий эффект предложенной операции составил 8 лет.

У 6 больных после экстирпации базальных бронхов была зарегистрирована гипертензия малого круга кровообращения, что свидетельствовало о нарушении проходимости сосудов в долях, отключенных от бронхиальной системы. При проведении селективной ангиографии отключенных сегментов отмечено повышение давления в ЛА на 30 мм.вод.ст., что свидетельствовало о нарушении проходимости как артериальных, так и венозных стволов этой зоны. По данным ангиопульмонографии практически во всех наблюдениях имело место сужение долевых и сегментарных артерий, идущих к отключенным от бронхиальной системы сегментам легкого. В то же время, исследование внешнего дыхания и газов крови у пациентов свидетельствовало об отсутствии значительного шунтирования до сосудам отключенных зон легкого.

У пациентов, перенесших plombировку бронхов, даже при значительной физической нагрузке, не возникали признаки дыхательной недостаточности и снижение P_{O_2} капиллярной крови. Эти факты исключали вероятность избыточного шунтирования при операциях экстирпации и plombировка пораженных зон легкого от бронхиальной системы. На наш взгляд, у таких больных гипертензия малого круга отсутствует вследствие сохранения сосудистого русла в отключенных сегментах легкого. Возможно, также она не возникает благодаря большим резервным возможностям пропускной способности сосудов малого круга в целом.


После установления Ю. Д. Волынским [1] факта резкого расширения бронхиальных артерий в пораженных зонах легкого при бронхоэктатической болезни (фото 1.) с выраженным право-левым шунтом возник еще один принципиальный вопрос: насколько операция экстирпации бронхов пораженной зоны легкого радикальна и в этом отношении. Для ответа на него обследовано 7 взрослых пациентов, перенесших в детском возрасте экстирпацию бронхов базальных сегментов легкого. При ангиографии было выявлено 2 типа изменений бронхиальных артерий: 1-й - культя бронхиальной артерии имела незначительные плевральные ветви; 2-й — разрастание бронхиальных сосудов, которые на периферии в некоторых отделах образовывали бронхо-альвеоло-легочные анастомозы, причем объем артерио-венозного сброса по таким сосудам не превышал 50 - 100 мл/мин, т. е. не имел существенного гемодинамического значения.

Фото 1.




Ангиография легкого

Интересным и пока необъяснимым является факт сохранения пневматизации зоны легкого после plombировки бронхов (фото 2.).



Бронхография. Сохранение пневматизации зоны легкого после пломбировки бронхов слева

Естественно, что пневматизация не возникает, если до операции этот участок легкого был в ателектазе или не имел паренхиматозной связи с вентилируемыми отделами легкого. Рентгенологически, особенно при селективной ангиопульмонографии, о степени пневматизации отключенного сегмента можно судить по величине углов ветвления сегментарных и более мелких ветвей ЛА. Только у 2 пациентов из 17 зафиксировали спадание ранее пневматизированного и затем отключенного от бронхиальной системы участка легкого, а также возникновения фиброателектаза, у остальных пневматизация сохранялась на 50-70%. Это, с нашей точки зрения, является большим преимуществом экстирпации и пломбировки бронхов перед обычными лоб- и билобэктомиями, так как отключенная от бронхиальной системы воздушная часть легкого, сохраняя свою пневматизацию, начинает играть роль биологического протеза, исключая существенное перемещение органов средостения, провисание верхних отделов, перегиб бронхов и эмфизематозное перерастяжение оставшихся здоровых участков легкого. Данный феномен имеет особое значение при необходимости оставления верхушки нижней доли и удаления базальных сегментов (фото 3).



Отключенная от бронхиальной системы воздушная часть легкого, сохраняя свою пневматизацию, начинает играть роль биологического протеза

При сравнительной оценке наилучшие отдаленные результаты получены у пациентов после

резекции и пломбировки бронхов базальных сегментов: лишь у 2 из 17 были отмечены признаки обострения хронического бронхита. При других вариантах подобные явления отмечены у менее чем половины больных. Однако изучение катamnестических данных свидетельствует, что клинические результаты определяются не только обширностью резекции, но и выраженностью хронического бронхита в оставшихся сегментах легкого. Как правило, если явления бронхита не купировались после операции, то отмечались значительные изменения со стороны внешнего дыхания: снижение жизненной емкости легких (ЖЕЛ), увеличение остаточного объема и функциональной емкости легких, снижение скорости форсированного выдоха и увеличение бронхиального сопротивления на уровне бронхов среднего и мелкого калибров. Подобные нарушения у больных с выраженным хроническим бронхитом возможны как после обычных резекций, так и после экстирпации и лобэктомии. При отсутствии признаков хронического бронхита ни у одного больного нарушения функционального состояния аппарата дыхания не отмечалось: ЖЕЛ была близка к норме, имелось лишь небольшое увеличение остаточного объема; газы крови не менялись даже при нагрузке.

Таким образом, органосохраняющие операции типа экстирпации и пломбировки пораженных бронхов при бронхоэктатической болезни у детей сопровождаются не только хорошим saniрующим эффектом, но и могут претендовать, в известной степени, на физиологичность вмешательства и долгосрочный позитивный эффект лечения. На протяжении последних 5 лет клинических наблюдений только у одного больного была отмечена вспышка воспалительного процесса. Ни у одного больного из числа оперированных по методике клиники не было найдено признаков абсцедирования отключенных зон легкого.

(Ранее экстирпация и пломбировка пораженных бронхов была изучена нами в экспериментальных исследованиях и обоснована их эффективность. Журнал. Педиатрия, Ташкент, 2011-№3-4.-С.17-19. Морфологическая характеристика результатов пломбировки бронхов в эксперименте.

Патент на изобретение №IAP 04387. 11.07.2011. Алиев М.М. и др., Способ лечения бронхоэктатической болезни у детей // Агентство по интеллектуально собственности РУз.)

Выводы

1. Экстирпация и пломбировка бронхов пораженных отделов легкого является равноправным методом хирургического лечения; особые преимущества операции прослеживаются при комбинированных и двусторонних поражениях.
2. После резекции и пломбировки бронхов в отключенной зоне легкого пневматизация сохраняется даже в отдаленные сроки, что играет положительную роль в заполнении остаточного объема грудной полости, препятствуя, пространственному перемещению бронхов здоровых отделов легкого и уменьшая растяжимость его паренхимы.
3. Опасность шунтирования справа налево при экстирпации и пломбировке бронхов значительно преувеличена, так как возможность сброса возникает только при высоком давлении в ЛА (на 30% выше исходного давления покоя).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алиев М.М., Шамирзаев Н.Х., Атаджанов Р.З. и др. Экстирпация бронхов при мешотчатых бронхоэктазах у детей. // Нагноительные заболевания легких и плевры: Тез. Докл. Республиканской научно-практической конференции с международным участием. Самарканд – 1998;11-12;
2. Воронов С.А., Лукьянченко П.П., Определение объема и варианта оперативного вмешательства при врожденных бронхоэктазах и кистозной гипоплазии у взрослых больных. // Грудная и сердечнососудистая хирургия. 2005; 2:42-46.
3. Исаков Ю.Ф., и соавт., «Детская хирургия». Москва, 2009.
4. Караваева С.А. и др., Диагностика и лечение врожденных пороков развития легких и средостения у новорожденных и детей раннего возраста. Вестник хирургии им. И.И. Грекова. 2015; 174(1):40–2.
5. Макаров А.В., Сокур П.П., Врожденные аномалии развития бронхолегочной системы (диагностика, хирургическое лечение). // Украинский пульмонологический журнал. 2003; 2:72-74.

6. Путов Н. В. Аномалии развития лёгких. Болезни органов дыхания. Под ред. акад. РАМН Н.Р. Палеева. / М.: Медицина, 2000; 549-559.
7. Разумовский А.Ю., и др., Эндоскопическая хирургия в педиатрии. / Руководство для врачей, "ГЭОТАР-Медиа", 2016.
8. Разумовский А.Ю., и др., Выбор метода лечения бронхоэктазии у детей // Хирургия им. Н.И. Пирогова. 2012; 7:31-37.
9. Рокицкий М.Р., Гребнев П.Н. Дискуссионные вопросы хирургии хронических неспецифических заболеваний легких у детей. // Детская хирургия. 2002; 4:32-34.
10. Самаль Т.Н. Пороки развития, наследственные и интерстициальные болезни легких у детей / Учебно-методическое пособие. - Минск БГМУ – 2014.
11. Сташук Г.А., Вишнякова М.В. (мл.), Щербина В.И., Захарова М.О. Врожденный аденоматоидный порок развития легкого 1-го типа у новорожденного. *Almanac of Clinical Medicine*. 2015 December; 43: 127–130.
12. Степанов А.А., Бадалян А.Р., Мельникова А.О. Бронхоэктатическая болезнь у детей. *Российский журнал перинатологии и педиатрии* 2018; 63:(5): 29–35. DOI: 10.21508/1027–4065–2018–63–5–29–35.
13. Черненко Ю.В., Горемыкин И.В., Бочкова Л.Г., Ключев С.А. Клиническое наблюдение: врожденная кистозная мальформация легкого. // *Саратовский научно-медицинский журнал*. 2014;10(2): 286–8.
14. Aksamit TR, O'Donnell AE, Barker A, et al. Adult bronchiectasis patients: a first look at the US Bronchiectasis Research Registry. // *Chest* 2017;151:982-92. [[Crossref](#)] [[PubMed](#)]
15. Brower KS, Del Vecchio MT, Aronoff SC. The etiologies of non-CF bronchiectasis in childhood: a systematic review of 989 subjects. // *BMC Pediatr* 2014; 14:4.
16. Chen HW, Hsu WM, Lu FL, Chen PC, Jeng SF, Peng SS, Chen CY, Chou HC, Tsao PN, Hsieh WS. Management of congenital cystic adenomatoid malformation and bronchopulmonary sequestration in newborns. // *PediatrNeonol*. 2010;51(3):172–7.
17. Goyal V., Grimwood K., Marchant J., Masters I.B., Chang A.B. Pediatric bronchiectasis: No longer an orphan disease. // *Ped.Pulmonol* 2016; 51(5): 450–469. DOI: 10.1002/ppul.23803.
18. Gupta A.K., Lodha R., Kabra S.K. Non Cystic Fibrosis Bronchiectasis. // *Indian J Pediatr* 2015; 82(10): 938–44. DOI: 10.1007/s12098-015-1866-4
19. Doyge A., Gallinaro LS. Current indications for the surgical treatment of pulmonary. // *ChirItal*. 2002; Mar-Apr; 54(2):12-14.
20. F. Ringshausen, A. de Roux, R. Diel, D. Hohmann, T. Welte, J. Rademacher. Bronchiectasis in Germany: a population-based estimation of disease prevalence // *ERJ* 2015;46:1805-1807
21. Lee AL, Burge AT, Holland AE. Airway clearance techniques for bronchiectasis. // *Cochrane Database Syst Rev* 2015; CD008351.
22. Piccione JC, McPhail GL, Fenchel MC, et al. Bronchiectasis in chronic pulmonary aspiration: risk factors and clinical implications. // *PediatrPulmonol* 2012; 47:447.
23. Pizzutto SJ, Bauert P, et al. Bronchoscopy contributes to the clinical management of indigenous children newly diagnosed with bronchiectasis. // *Ped.Pulmonol* 2013; 48:67.
24. Svenningsen S, Guo F, McCormack DG, Parraga G. Noncystic Fibrosis Bronchiectasis: Regional Abnormalities and Response to Airway Clearance Therapy Using Pulmonary Functional Magnetic Resonance Imaging. // *AcadRadiol* 2017; 24:4.
25. Rothenberg SS. Thoracoscopic pulmonary surgery. // *Congress in Pediatric Surgery, Doha-2019*; 04:006-008.

Поступила 20.03.2024